



پارامترهای جدول زندگی و ظرفیت شکارگری کنه شکارگر *Typhlodromus bagdasarjani* (Phytoseiidae) با تغذیه از کنه گیاهخوار *Cenopalpus irani* Dosse (Tenuipalpidae) پرورش داده شده روی ارقام مختلف سیب

فاطمه جعفریان¹، یعقوب فتحی پور² و شهریار جعفری¹

¹ - گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

✉ jafarianfatemeh93@gmail.com <https://orcid.org/0009-0003-0778-4637>

✉ Shahriar.s@lu.ac.ir <https://orcid.org/0000-0002-8814-1953>

² - گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

✉ fathi@modares.ac.ir <https://orcid.org/0000-0002-7963-5409>

چکیده: پارامترهای جدول زندگی و میزان شکار کنه شکارگر *Typhlodromus bagdasarjani* (Phytoseiidae) و *Cenopalpus irani* Dosse (Tenuipalpidae) پرورش یافته روی چهار رقم سیب شامل: با تغذیه از پوره‌های کنه تارتن دروغین ایرانی *Cenopalpus irani* Dosse (Tenuipalpidae) پرورش یافته روی چهار رقم سیب شامل: گلاب کهنز، کالا امپریال، قرمز لبنان و گرانی اسمیت در شرایط آزمایشگاهی تعیین شد. طولانی‌ترین زمان رشد مراحل نابالغ در ماده‌ها در گلاب کهنز و کوتاه‌ترین زمان رشد مراحل نابالغ ماده‌ها در گرانی اسمیت مشاهده شد. باروری از ۱۹/۱۷ تخم/ماده در گلاب کهنز تا ۳۲/۷۸ تخم/ماده در گرانی اسمیت متغیر بود. بیش‌ترین و کم‌ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) به ترتیب در گرانی اسمیت (۰/۲۵۱) بر روز) و گلاب کهنز (۰/۱۱۳) بر روز) به دست آمد. کل طعمه مصرفی تمام مراحل نابالغ در گلاب کهنز، کالا امپریال، قرمز لبنان و گرانی اسمیت به ترتیب ۴۲/۹۰، ۳۴/۷۱، ۳۱/۸۳ و ۲۴/۵۳ طعمه بودند. مجموع تعداد طعمه مصرفی ماده‌های بالغ ۵۴۳/۷۶ طعمه در گلاب کهنز، ۴۱۹/۴۰ طعمه در کالا امپریال، ۳۷۶/۸۷ طعمه در قرمز لبنان و ۲۷۶/۷۶ طعمه در گرانی اسمیت بود. نتایج ما نشان داد که عملکرد شکارگر به شدت تحت تاثیر تغذیه از کنه‌های گیاهخوار *C. irani* پرورش یافته روی ارقام مختلف سیب قرار گرفت و همچنین تفاوت قابل توجهی در ظرفیت شکار *T. bagdasarjani* روی ارقام مختلف سیب دیده شد.

تاریخچه مقاله

دریافت:/..

پذیرش:/..

دبیر تخصصی:

واژه‌های کلیدی: کنه تارتن دروغین ایرانی، *Cenopalpus irani*، *Typhlodromus bagdasarjani*، جدول زندگی، ارقام سیب

Citation: Jafarian, F., Fathipour, Y & Jafari, S (202x) Life table parameters and predation capacity of *Typhlodromus bagdasarjani* (Phytoseiidae) fed on *Cenopalpus irani* (Tenuipalpidae) reared on different apple cultivars. *J. Entomol. Soc. Iran*, x (x), xx-xx.

مقدمه

کنه‌های تارتن دروغین خانواده Tenuipalpidae در سراسر جهان پراکنده شده‌اند و شامل چندین گونه آفت مهم اقتصادی هستند (Mesa et al., 2009). کنه‌ها در سراسر دنیا به محصولات مختلف باغی، زراعی و گیاهان وحشی حمله می‌کنند (Zaher & Yousef, 1972). کنه تارتن دروغین *Cenopalpus irani* Dosse در باغ‌های سیب نواحی غربی ایران به صورت گسترده وجود دارد و برای اولین بار از نواحی کرج و شیراز در ایران گزارش شد (Dosse, 1971). این کنه همچنین از اهواز، همدان و کرمانشاه نیز گزارش شده است (Darbemamieh, 2009; Khanjani, 1996; Kamali, 1989). این گونه، آفت مهم درختان سیب است که روی درختان مختلف از جمله گلابی، زیتون و پسته نیز گزارش شده است (Rashki et al., 2004; Mehrnejad & Ueckerman, 2001). همچنین روی گیاهان زینتی و در نمونه‌های خاک نیز مشاهده و گزارش شده است (Kamali et al., 2001). بررسی تغییرات جمعیت این کنه نشان داد که جمعیت آن به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر دما و رطوبت قرار می‌گیرد، به طوری که اوج جمعیت این کنه همزمان با بالا رفتن دما و کاهش رطوبت هوا مشاهده شده است (Jafari et al., 2014). پارامترهای جدول زندگی کنه گیاهخوار *C. irani* در دماهای مختلف روی برگ سیب در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که مراحل مختلف رشدی این کنه به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر دماهای مختلف قرار می‌گیرد و این ویژگی می‌تواند در برنامه‌های کنترل بیولوژیکی علیه این آفت مورد استفاده قرار گیرد (Bazgir et al., 2015a, 2015b).



مهار کنه‌های درختان سیب در ایران عمدتاً بر اساس استفاده از آفت کش‌های شیمیایی است (Khanjani & Hadad Irani-Nejad, 2006). استفاده از آفت کش‌های شیمیایی باعث بروز مشکلاتی مانند آلودگی زیست محیطی، کاهش جمعیت دشمنان طبیعی، ایجاد مسمومیت‌های مزمن و حاد در انسان و جانوران غیر هدف، ایجاد آثار کشنده بر روی بندپایان مفید و باقی ماندن در مواد غذایی می‌شود (Guedes et al., 2016; Desneux et al., 2007; Carbonaro et al., 1986). بنابراین، روش‌های جایگزین مانند کنترل بیولوژیک، استفاده از ارقام مقاوم و یا ادغام این روش‌ها می‌توانند مناسب‌ترین راه حل برای کاهش مصرف سموم شیمیایی و همچنین به عنوان روش‌هایی مکمل در کنترل آفات در بوم‌سامانه‌ها کشاورزی باشند (Khanamani et al., 2014; Kaplan & Thaler, 2010; Ode, 2006; Skirvin & De Courcy Williams, 1999; Maxwell & Jennings, 1931; Bottrell et al., 1998).

پژوهش‌های مختلف ثابت کرده‌اند که شکل، طول و تراکم تریکوم‌های سطح برگ بر پارامترهای جدول زندگی گیاه‌خواران، حشرات و کنه‌ها تاثیر می‌گذارند، همچنین تولید متابولیت‌های ثانویه مانند پروتئین‌های خاص، فنل‌ها، سموم و ترکیبات فرار گیاهان برای دفاع در برابر گیاه‌خواران به خوبی اثبات شده است (Jafarian et al., 2022; Prager et al., 2018; Tian et al., 2012). استفاده از ارقام مقاوم به عنوان یکی از کارآمدترین و مفیدترین روش‌های مهار در برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) بوده و هسته مرکزی آن را تشکیل می‌دهد (Khanamani et al., 2014; Tian et al., 2012; Lorenzen et al., 2001; Trumble et al., 2000). تفاوت در خواص فیزیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف گیاه میزبان ممکن است بر سطوح غذایی بالاتر (پراکنش، فراوانی و عملکرد شکارگران) به صورت مثبت یا منفی تاثیر بگذارد (Schadler et al., 2010; Hunter, 2003; Havill & Raffa, 2000; Bottrell et al., 1998). کیفیت گیاه میزبان نه تنها بر عملکرد گیاه‌خواران در سطح تغذیه‌ای دوم بلکه روی دشمنان طبیعی آنها در سطح تغذیه‌ای سوم نیز تاثیر می‌گذارد (Khanamani et al., 2014; Kagata et al., 2005). (Gingras & Boivin 2002). فعل و انفعالات سطوح غذایی سه گانه که بین گیاهان، گیاه‌خواران و دشمنان طبیعی رخ می‌دهد بسیار پیچیده است (Khanamani et al., 2014; Boethel & Eikenbary, 1986). پویایی جمعیت یک شکارگر به کیفیت گیاه میزبانی بستگی دارد که طعمه‌اش از آن تغذیه می‌کند (Skirvin & De Courcy Williams, 1999).

استفاده از گیاهان مقاوم با سایر روش‌های کنترل سازگار است و ممکن است با تاثیر منفی بر طعمه، کارایی دشمنان طبیعی را افزایش دهد (Lorenzen et al., 2001). از آنجایی که آفات بر روی گیاهان مقاوم به کندی رشد می‌کنند، اغلب فرض می‌شود که مقاومت باعث افزایش ظرفیت کنترل بیولوژیک می‌شود (Bergman & Tingey, 1979; Boethel & Eikenbary, 1986). برخی از مطالعات نشان داده‌اند که عوامل کنترل بیولوژیک در ترکیب با مقاومت گیاه میزبان می‌تواند به عنوان یک روش مکمل در برنامه‌های کنترل آفات استفاده شود (Rojas & Morales-Ramos, 2010; Skirvin & De Courcy Williams, 1999; Khanamani et al., 2014). بررسی پژوهش‌های انجام شده در مورد استفاده تلفیقی ارقام مقاوم و عوامل کنترل بیولوژیک در اغلب موارد قابل تلفیق بودن این دو روش را نشان می‌دهد (Hare, 1992; Gould et al., 1991; Boethel & Eikenbary, 1986). به هر حال این فرضیه همیشه قابل قبول نیست زیرا ترکیبات شیمیایی ارقام مقاوم ممکن است تاثیر منفی نیز روی کارایی شکارگرها (از قبیل کاهش نرخ زنده‌مانی، باروری و در نهایت کاهش نرخ ذاتی افزایش جمعیت) داشته باشند (Bergman & Tingey, 1979; Ode, 2006).

کنه شکارگر *Typhlodromus bagdasarjani* Wainstein & Arutunjan به عنوان یک شکارگر عمومی در سطح وسیعی از کشور ایران، به ویژه روی درختان میوه و در ارتباط با کنه‌های Eriophyidae، Tydeidae، Tenuipalpida، Tetranychidae، و سفید بالک‌ها دیده می‌شود (Rahmani et al., 2010; Jafari et al., 2010). این کنه شکارگر روی درختان مختلف به راحتی یافت می‌شود و بیشترین تراکم جمعیت آن در ایران روی درختان انجیر، سیب، گردو و انار بوده است (Jafari & Bazgir, 2015; Jafari et al., 2010; Hajizadeh et al., 2002; Kamali et al., 2001). بر اساس طبقه‌بندی مک‌مورتی و کرافت می‌توان این شکارگر را در گروه شکارگرهای عمومی (تیپ سوم) قرار داد (McMurtry et al., 2013; McMurry & Croft, 1997). این شکارگر یک گونه بومی منطقه خاورمیانه است که از ایران، لبنان، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان و ترکمنستان گزارش شده است (Jafari et al., 2010; Demite et al., 2014). سازگاری بالای *T. bagdasarjani* به دمای بالا در تابستان و همچنین توسعه و تکثیر روی طیف وسیعی از منابع غذایی باعث شده تا بتوان از آن به عنوان یک عامل مناسب در کنترل برخی از کنه‌ها از جمله کنه تارتن دولک‌های در گلخانه و محیط بیرون نام برد (Moghadasi et al., 2014; Khanamani et al., 2014; Farzmand et al., 2012; Ganjisaffar et al., 2011b). با وجود پتانسیل این شکارگر به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک بومی، مطالعات انجام شده روی آن بیشتر حول کنترل و مدیریت کنه تارتن دولک‌های بوده و روی کارایی آن روی سایر آفات بررسی چندانی صورت نگرفته است. از آنجایی که این کنه شکارگر از کشورهای محدودی گزارش شده، مطالعات انجام شده در مورد آن محدود به چند پژوهش است (Moghadasi & Allahyari, 2017; Moghadasi et al., 2016; Riahhi et al., 2015; Khanamani et al., 2015; Jafari & Bazgir, 2015; Moghadasi et al., 2014; Moghadasi et al., 2013). بررسی پارامترهای جدول زندگی و تولیدمثلی این کنه در دماهای مختلف نشان داد که این کنه کارایی مطلوبی در دامنه وسیعی از دماها دارد و می‌تواند یک عامل بیولوژیک مؤثر در کنترل جمعیت کنه تارتن دولک‌های باشد (Ganjisaffar et al., 2011a, 2011b). (Jafarian et al., 2023). تاثیر ارقام مختلف سیب را بر کارایی بیولوژیک کنه شکارگر *T. bagdasarjani* با تغذیه از *E. frosti* بررسی کردند و نشان دادند نرخ ذاتی افزایش جمعیت این شکارگر روی رقم گلاب که کمتر از سایر ارقام مورد آزمایش و همچنین نرخ مصرف طعمه در کل دوره نابالغ روی همین رقم بیشتر از سایر ارقام مورد آزمایش بود.

با وجود اینکه کنه گیاه‌خوار *C. irani* در بیش‌تر مناطق کشت سیب در کشور به عنوان یکی از آفت مهم مطرح می‌باشد، تاکنون مطالعه جامعی در خصوص ارزیابی میزان مقاومت ارقام مختلف سیب نسبت به کنه *C. irani* و همچنین بررسی میزان کارایی کنه‌های شکارگر خانواده Phytoseiidae روی ارقام مختلف این میزبان گیاهی صورت نگرفته است. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر رفع کاستی‌های موجود در این زمینه می‌باشد. نتایج به دست آمده می‌تواند کمک شایانی به طراحی استراتژی‌های مناسب در کنترل تلفیقی آن کنه در باغ‌های سیب نماید.

مواد و روش‌ها

پرورش کلنی کنه‌ها. برای تهیه کلنی کنه‌های *Cenopalpus irani* برای انجام آزمایش از برگ‌های سیب موجود در باغ سیب واقع در منطقه کمالوند شهرستان خرم‌آباد نمونه‌برداری به عمل آمد. برای این کار برگ‌های سیب آلوده به این کنه جمع‌آوری شد و درون کیسه‌های پلاستیکی به آزمایشگاه انتقال داده شد. سپس کنه‌ها در دمای 25 ± 1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60 ± 5 درصد و شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی نگهداری شدند. کنه‌های جمع‌آوری شده به چهار گروه تقسیم شدند و هر گروه روی محیط پرورش جداگانه‌ای متشکل از هر یک از چهار رقم مورد آزمایش ما منتقل و به مدت سه نسل پرورش داده شدند. برای اطمینان از شناسایی درست کنه‌ها از آنها پراپاراسیون تهیه و شناسایی شدند. محیط پرورش *C. irani* روی هر رقم به این صورت آماده شد که ابتدا داخل ظرف پتری پلاستیکی به قطر ۹ سانتی‌متر و ارتفاع ۲ سانتی‌متر لایه نازکی از پنبه قرار داده شد و پنبه با آب آغشته شد. سپس برگ کامل و سالمی از رقم مورد آزمایش روی لایه نازک پنبه به نحوی قرار داده شد که قسمت زیری برگ رو به بالا باشد. سپس یک گروه از کنه‌ها روی برگ رقم مربوطه منتقل و به مدت سه نسل روی همان رقم پرورش یافتند. هر سه روز یکبار برگ تازه رقم مورد آزمایش برای تغذیه کنه گیاه‌خوار جایگزین می‌شد. در نهایت بعد از گذشت سه نسل، از پوره‌های نسل سوم پرورش یافته روی رقم مورد آزمایش برای تغذیه کنه‌های شکارگر استفاده شد.

برای تهیه کلنی کنه‌های شکارگر *T. bagdasarjani* از باغات سیب آلوده به کنه *C. irani* واقع در منطقه کمالوند شهرستان خرم‌آباد استفاده شد. سپس کنه‌های شکارگر جمع‌آوری شده از کلنی پوره‌های *C. irani* روی برگ‌های سیب موجود در واحدهای پرورشی فوق‌الذکر پرورش یافتند. پیش از شروع آزمایش‌ها، کنه‌های شکارگر به مدت سه نسل روی مراحل پورگی *C. irani* پرورش یافته روی هر رقم به صورت جداگانه، پرورش یافتند. این کنه‌ها داخل انکوباتور در دمای 25 ± 1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60 ± 5 درصد و شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی نگهداری شدند.

تهیه واحد پرورش. برای این کار دیسک‌های برگی هر رقم سیب به طور جداگانه به عنوان محیط پرورش مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا داخل ظروف پتری‌های پلاستیکی ۶ سانتی‌متری لایه نازکی از پنبه قرار داده شد و با آب آغشته شد. سپس برگ‌های سیب هر رقم به ابعاد 4×4 سانتی‌متر روی لایه نازکی از پنبه به نحوی قرار داده شد که قسمت زیری برگ رو به بالا باشد. همچنین در اطراف برگ سیب هر رقم نیز یک لایه نازک از پنبه آغشته به آب برای کاهش احتمال فرار کنه‌ها و همچنین کمک به خشک نشدن زود هنگام و تازه ماندن برگ‌های سیب قرار داده شد. سپس این پتری‌ها درون ظروف پتری بزرگتر به قطر ۹ سانتی‌متر قرار داده شد، این ظروف پتری بزرگ همواره تا نیمه پر از آب شدند تا هم آب مورد نیاز برای اشباع دائمی پنبه‌ها فراهم شود و هم در کاهش فرار کنه‌ها کمک کند. در قسمت درپوش ظروف پتری برای ایجاد تهویه یک سوراخ به قطر یک سانتی‌متر ایجاد شد که با توری دارای سوراخ‌های بسیار ریز پوشانده شد. تمام واحدهای پرورش و ظروف آزمایش در انکوباتور (KW Apparacchi Scientifici, Siena, Italy)، با دمای 25 ± 1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60 ± 5 درصد و شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی نگهداری شدند.

تعیین پارامترهای جدول زندگی *Typhlodromus bagdasarjani* روی چهار رقم سیب. پارامترهای جدول زندگی کنه شکارگر *T. bagdasarjani* روی چهار رقم سیب در دمای 25 ± 1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60 ± 5 درصد و شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی تعیین شد. برای به دست آوردن تخم هم سن از *T. bagdasarjani* تعداد ۲۰۰ عدد از افراد ماده جفت‌گیری کرده از کلنی بر روی یک دیسک برگی از هر یک از چهار رقم سیب منتقل شدند. پس از ۱۲ ساعت با حذف ماده‌ها و تخم‌های اضافی تنها یک عدد از تخم‌های تازه گذاشته شده روی دیسک برگی ماند و ماده‌ها و تخم‌های اضافی حذف شدند. آزمایش در ۷۰ تکرار برای هر رقم انجام شد. برای تامین طعمه مورد نیاز کنه شکارگر، تراکم‌های مناسبی از مراحل مختلف پورگی طعمه (پوره سن اول و پوره سن دوم) داخل واحدهای پرورش قرار داده شد. برای تعیین طول دوره‌های نابالغ کنه شکارگر، روزانه واحدهای پرورش زیر استریومیکروسکوپ تا زمان رسیدن به مرحله بالغ مورد بررسی قرار گرفتند. با ظهور کنه‌های بالغ، افراد نر و ماده با یکدیگر جفت شده و به درون دیسک‌های برگی جداگانه‌ای منتقل شدند. در بازدیدهای روزانه دوره قبل از تخم‌گذاری بالغ (APOP)، دوره قبل از تخم‌گذاری کل (TPOP)، دوره تخم‌گذاری، باروری و طول عمر بالغین تا زمان مرگ همه افراد اندازه‌گیری شد.

میزان تغذیه کل و روزانه کنه *Typhlodromus bagdasarjani*. آزمایش تعیین تعداد طعمه خورده شده در شرایط آزمایشگاهی مشابه آزمایش‌های بالا انجام شد. لاروها بلافاصله پس از ظهور به واحدهای پرورش منتقل شدند و ذخیره غذایی کافی از مرحله پوره سن اول کنه *C. irani* پرورش یافته روی چهار رقم سیب شامل: گلاب کهنژ، کالا امپریال، قرمز لبنان و گرانی‌اسمیت در اختیار آنها قرار داده شد. واحدهای پرورش روزانه تا زمان ظهور کنه‌های بالغ مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد طعمه مصرف شده پس از شمارش با کنه‌های تازه جایگزین شد. پس از ظهور افراد بالغ، نر و ماده‌ها جفت شده و بلافاصله پس از جفت‌گیری، افراد نر حذف شده و میزان تغذیه ماده‌ها تا زمان مرگ آنها شمارش شد. با انجام یک آزمایش مقدماتی تعداد طعمه مورد نیاز هر مرحله تعیین و سپس طعمه مازاد بر طعمه مورد نیاز در نظر گرفته شد. لارو این شکارگر تغذیه نداشت. برای پوره سن اول، پوره سن دوم و کنه‌های بالغ ماده شکارگر به ترتیب ۳۰، ۵۰ و ۶۰ عدد از پوره سن اول کنه میزبان قرار داده شد. تعداد طعمه‌های مصرف شده روزانه شمارش و یادداشت شدند. در پایان میزان متوسط تغذیه روزانه و کل میزان تغذیه هر مرحله سنی تعیین شد. آزمایش‌ها تا زمان مرگ آخرین فرد ادامه یافت و روزانه واحدهای پرورش برای شمارش طعمه‌های خورده شده مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد طعمه‌های خورده شده روزانه ثبت شد. آزمایش در ۳۰ تکرار برای مراحل نابالغ و بالغ انجام شد.

تجزیه داده‌ها. داده‌های به دست آمده از جدول زندگی با استفاده از جدول زندگی دو جنسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (Chi & Liu, 1985). نرخ بقاء ویژه سنی - مرحله سنی (l_{xy}) (در اینجا $x =$ سن و $y =$ مرحله)، باروری ویژه سنی - مرحله سنی (f_{xy})، مرگ و میر ویژه سنی - مرحله سنی (q_{xy})، امید به زندگی سنی - مرحله سنی (e_{xy})، ارزش ویژه سنی - مرحله سنی تولید مثل (p_{xy})، نرخ بقاء ویژه سنی (l_x)، باروری ویژه سنی (m_x) و پارامترهای رشد جمعیت شامل: نرخ خاص تولیدمثل (R_0)، میانگین مدت زمان یک نسل (T)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) توسط برنامه TWSEX-MSChart (Chi, 2018) برآورد شد. روش بوت استرپ برای تخمین واریانس‌ها و خطاهای استاندارد زمان‌های رشد، دوره‌های تولید مثل، باروری، طول عمر افراد بالغ و پارامترهای

رشد جمعیت استفاده شد (Huang & Chi, 2013). برای تکرار کردن داده‌های پارامترهای رشد جمعیت از روش بوت‌استرپ با تکرار ۱۰۰۰۰۰ استفاده شد. پس از معنی‌دار شدن اختلاف میانگین‌ها، گروه بندی تیمارها با استفاده از روش Paired Bootstrap در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد و برای رسم نمودارها از نرم‌افزار سیگماپلات نسخه ۱۲/۵ استفاده شد. برای تعیین تفاوت معنی‌دار بین طول کلیه مراحل نابالغ نر و ماده از آزمون Student t-test استفاده شد ($P < 0.05$). برای مقایسه میزان طعمه مصرف شده توسط کنه شکارگر در ارقام مختلف سیب از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SAS 9.1 (SAS software, 2003) استفاده شد. پس از مشخص شدن معنی‌دار بودن اختلاف میانگین‌ها با استفاده از آزمون توکی در سطح ۰/۵ مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج

طول دوره‌های رشد و نمو مراحل نابالغ. طول دوره رشد و نمو مراحل نابالغ کنه *T. bagdasarjani* در مراحل پورگی کنه *C. irani* در بین چهار رقم سیب کاملاً معنی‌دار بود (جدول ۱). کل طول دوره رشد و نمو مراحل نابالغ ماده‌ها در رقم گرانی اسمیت ۵/۷۳ روز بود که به طور قابل توجهی کوتاه‌تر از سایر ارقام مورد آزمایش بود. بیش‌ترین و کم‌ترین طول دوره‌ی رشد نابالغ نرها به ترتیب در رقم گلاب کهنژ با ۹/۹۰ روز و گرانی اسمیت با ۵/۶۱ روز بود ($P < 0.05$) (جدول ۱). بر اساس نتایج حاصل از آزمون Student t-test بین طول کلیه‌ی مراحل نابالغ کنه‌های نر و ماده *T. bagdasarjani* در چهار رقم سیب مشخص شد که در ارقام گالا امپریال ($T= 2.70$; $P= 0.05$)، قرمز لبنان ($T= 2.58$; $P= 0.16$) و گلاب کهنژ ($T= 2.96$; $P= 0.22$) ماده‌ها به طور قابل توجهی سریع‌تر از نرها رشد کردند در حالی که در رقم گرانی اسمیت ($T= 1.55$; $P= 0.96$) اختلاف معنی‌داری در زمان رشد نرها و ماده‌ها مشاهده نشد.

جدول ۱- میانگین (\pm خطای معیار) طول دوره‌ی رشد و نمو مراحل نابالغ کنه ماده و نر کنه شکارگر *Typhlodromus bagdasarjani* با تغذیه از مراحل پورگی کنه گیاه‌خوار *Cenopalpus irani* پرورش یافته روی چهار رقم سیب.

Table 1. Duration (mean \pm SE) the developmental time of female and male immature stages of *Typhlodromus bagdasarjani* reared on nymphal stages of *Cenopalpus irani* on four apple cultivars.

Developmental stage	Apple cultivars			
	Kohanz Golab	Emperial Gala	Lebanon Red	Granny smith
Female				
Egg	2.75 \pm 0.06 a	2.14 \pm 0.05 b	1.92 \pm 0.04 b	1.57 \pm 0.07 c
Larva	1.90 \pm 0.04 a	1.43 \pm 0.07 b	1.22 \pm 0.06 c	1.02 \pm 0.02 c
Protonymph	2.82 \pm 0.06 a	2.07 \pm 0.04 b	1.87 \pm 0.05 b	1.47 \pm 0.07 c
Deutonymph	3.04 \pm 0.03 a	2.36 \pm 0.07 b	2.07 \pm 0.04 b	1.66 \pm 0.07 c
Immature stages	10.53 \pm 0.12 a	8.02 \pm 0.15 b	7.10 \pm 0.14 c	5.73 \pm 0.19 d
Male				
Egg	2.68 \pm 0.10 a	2.04 \pm 0.04 b	1.82 \pm 0.08 bc	1.55 \pm 0.12 c
Larva	1.77 \pm 0.09 a	1.32 \pm 0.10 b	1.08 \pm 0.06 c	1.00 \pm 0.00 c
Protonymph	2.63 \pm 0.10 a	1.86 \pm 0.07 b	1.69 \pm 0.9 b	1.38 \pm 0.11 c
Deutonymph	2.81 \pm 0.08 a	2.32 \pm 0.10 b	1.95 \pm 0.18 bc	1.67 \pm 0.11 c
Immature stages	9.90 \pm 0.34 a	7.54 \pm 0.17 b	6.56 \pm 0.22 c	5.61 \pm 0.31 d

Means followed by different letters within each row are significantly different according to the paired bootstrap test ($P < 0.05$).

طول عمر و باروری کنه شکارگر *T. bagdasarjani*. دوره قبل از تخم‌ریزی افراد بالغ (APOP) و دوره پیش از تخم‌ریزی کل (TPOP) به ترتیب به عنوان فاصله زمانی بین ظهور افراد بالغ تا اولین تخم‌ریزی و فاصله زمانی بین تولد تا اولین تخم‌ریزی تعیین شد. APOP، طول عمر، TPOP و باروری *T. bagdasarjani* به طور قابل توجهی تحت تأثیر ارقام مختلف سیب قرار گرفتند (جدول ۲). کم‌ترین طول دوره پیش‌از تخم‌ریزی کنه شکارگر ۱/۳۸ روز بود که روی رقم گرانی اسمیت مشاهده شد و بیش‌ترین مقدار نیز ۲/۴۶ روز بود و روی رقم گلاب کهنژ مشاهده گردید. کم‌ترین و بیش‌ترین میانگین طول دوره پیش از تخم‌ریزی کل به ترتیب مربوط به کنه‌های پرورش یافته روی ارقام گرانی اسمیت (۷/۱۲ روز) و گلاب کهنژ (۱۳/۰۴ روز) بود (جدول ۲). همچنین تأثیر ارقام مختلف بر طول دوره تخم‌ریزی نیز کاملاً معنی‌دار بود و از ۱۸/۹۵ روز روی رقم گلاب کهنژ تا ۱۱/۰۴ روز روی رقم گرانی اسمیت متغیر بود. حداکثر میزان زادآوری برابر ۳۲/۷۸ تخم/ماده روی رقم گرانی اسمیت مشاهده شد در حالی که حداقل میزان زادآوری برابر ۱۹/۱۷ تخم/ماده روی رقم گلاب کهنژ به دست آمد. طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین دوره طول عمر ماده‌ها به ترتیب در گلاب کهنژ (۳۰/۹۲ روز) و گرانی اسمیت (۱۸/۴۰ روز) بود. طول عمر نرها در گلاب کهنژ ۲۸/۳۱ روز بود که بیش‌تر از سایر ارقام مورد آزمایش بود. نسبت جنسی ماده‌ها از ۵۸ درصد در گرانی اسمیت تا ۶۶ درصد در گلاب کهنژ متغیر بود (جدول ۲).


نرخ زنده مانی و زادآوری ویژه سنی کنه شکارگر *T. bagdasarjani*. نرخ بقاء ویژه سنی-مرحله سنی (S_x) کنه‌ی *T. bagdasarjani* با تغذیه از *C. irani* در شکل ۱ نشان داده شده است. با توجه به این نمودارها، احتمال این که یک تخم تازه متولد شده روی ارقام مختلف سیب (گلاب کهنژ، گالا امپریال، قرمز لبنان و گرانی اسمیت) تا مرحله بلوغ زنده بماند برای نرها به ترتیب ۰/۳۱، ۰/۳۱، ۰/۳۲، ۰/۲۵ درصد و برای ماده‌ها به ترتیب ۰/۵۸، ۰/۵۸، ۰/۵۷ و ۰/۶۰ درصد می‌باشد.

جدول ۲- میانگین (\pm خطای معیار) طول مراحل پیش از تخم‌ریزی بالغ، تخم‌ریزی، پیش از تخم‌ریزی کل، طول عمر بالغین، باروری و نسبت جنسی کنه شکارگر *Typhlodromus bagdasarjani* با تغذیه از مراحل پورگی کنه گیاه‌خوار *Cenopalpus irani* پرورش یافته روی چهار رقم سیب.

Table 2. Mean (\pm SE) APOP, oviposition days, TPOP, adult longevity, fecundity and sex ratio of *Typhlodromus bagdasarjani* fed on nymphal stage of *Cenopalpus irani* at four apple cultivars.

Parameters	Apple cultivars			
	Kohanz Golab	Imperial Gala	Lebanon Red	Granny Smith
APOP* (days)	2.46 \pm 0.12 a	1.97 \pm 0.07 b	1.75 \pm 0.11 b	1.38 \pm 0.07 c
Oviposition days (days)	18.95 \pm 0.51 a	15.87 \pm 0.50 b	14.07 \pm 0.42 c	11.04 \pm 0.29 d
TPOP** (days)	13.04 \pm 0.11 a	10.00 \pm 0.16 b	8.85 \pm 0.19 b	7.12 \pm 0.18 c
Female longevity (days)	30.92 \pm 0.52 a	25.73 \pm 0.54 b	23.15 \pm 0.43 c	18.40 \pm 0.38 d
Male longevity (days)	28.31 \pm 0.62 a	24.72 \pm 0.64 b	22.52 \pm 0.56 c	18.27 \pm 0.65 d
Fecundity (eggs/female)	19.17 \pm 0.51 c	24.46 \pm 0.79 b	27.52 \pm 0.69 b	32.78 \pm 1.38 a
Sex ratio (F/F + M)	0.66%	0.65 %	0.63 %	0.58%


*APOP: Adult pre-oviposition period. **TPOP: Total pre-ovipositional period (from egg to first oviposition). The means followed by different letters in the same row are significantly different ($P < 0.05$, paired-bootstrap test).



شکل ۱- نرخ بقاء ویژه سنی-مرحله سنی (S_{xj}) کنه *Typhlodromus bagdasarjani* با تغذیه از مراحل پورگی *Cenopalpus irani* پرورش یافته روی چهار رقم سیب.

Fig. 1. Age-stage-specific survival rate (S_{xj}) of *Typhlodromus bagdasarjani* fed on *Cenopalpus irani* nymphal stages reared on four apple cultivars.

نرخ بقاء ویژه سنی (l_x)، باروری ویژه سنی (m_x) و باروری ویژه سنی ماده (f_{xj}) کنه شکارگر *T. bagdasarjani* تا حد زیادی تحت تاثیر ارقام مختلف سیب قرار گرفت و همانطور که دیده می شود کنه شکارگر *T. bagdasarjani* روی هر چهار رقم سیب قادر به تکمیل دوره رشد و نمو خود بود (شکل ۲). باروری ویژه سنی-مرحله سنی (f_{xj}) تعداد نتاج تولید شده توسط هر فرد کنه شکارگر را در سن x و مرحله j نشان می دهد. نرخ باروری ویژه سن (f_{xj}) در روز بیست و دوم در گلاب کههنز (۱/۰۷ تخم/ماده)، در روز هفدهم در گالا امپریال (۲/۳۲ تخم/ماده)، در روز پانزدهم در قرمز لبنان (۲/۸۷ تخم/ماده) و در روز یازدهم در گرانی اسمیت (۴/۰۹ تخم/ماده) به اوج خود رسید. اولین تخم ریزی ماده در روز دهم در گلاب کههنز، در روز نهم در گالا امپریال، در روز ششم در قرمز لبنان و در روز ششم در گرانی اسمیت رخ داد (شکل ۲).



شکل ۲- نرخ بقاء ویژه سنی (l_x)، باروری ویژه سنی (m_x) و باروری ویژه سنی ماده (f_{xj}) کنه *Typhlodromus bagdasarjani* با تغذیه از مراحل پورگی *Cenopalpus irani* پرورش یافته روی چهار رقم سیب.

Fig. 2. The age-specific survivorship (l_x), age-specific fecundity rates (m_x) and age-stage-specific fecundity (f_{xj}) of *Typhlodromus bagdasarjani* fed on *Cenopalpus irani* nymphal stages reared on four apple cultivars.

پارامترهای رشد جمعیت. پارامترهای رشد جمعیت *T. bagdasarjani* با تغذیه از مراحل پورگی *C. irani* پرورش یافته روی چهار رقم سیب در جدول ۳ ارائه شده است. مقایسه میانگین اثر ارقام مختلف بر نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) این کنه معنی دار بود. نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) از ۱۲/۵۶ تخم به ازای هر فرد در گلاب کههنز تا ۲۳/۰۰ تخم به ازای هر فرد در گرانی اسمیت متغیر بود. نرخ خالص تولید مثل (R_0) نیز از ۱۱/۲۳ تخم به ازای هر فرد در گلاب کههنز تا ۱۹/۶۲ تخم به ازای هر فرد در گرانی اسمیت متغیر بود (جدول ۳). تأثیر ارقام مختلف بر میزان نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) نیز کاملاً معنی دار بود. بالاترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در رقم گرانی اسمیت (۰/۲۵۱ بر روز) بود و در سایر ارقام به ترتیب شامل: قرمز لبنان، کالا امپریال و گلاب کههنز کاهش یافت. بیشترین میزان نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) روی رقم گرانی اسمیت (۱/۲۸۷ بر روز) و کمترین میزان آن روی گلاب کههنز (۱/۱۲۰ بر روز) به دست آمد. متوسط مدت زمان یک نسل (T) نیز روی ارقام مورد آزمایش به طور معنی داری با هم متفاوت بود. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار این پارامتر مربوط به کنه‌های پرورش یافته روی رقم گلاب کههنز و کمترین مقدار این پارامتر مربوط به کنه‌های پرورش یافته روی رقم گرانی اسمیت بود (جدول ۳).

جدول ۳- پارامترهای رشد جمعیت (\pm خطای معیار) کنه شکارگر *Typhlodromus bagdasarjani* با تغذیه از مراحل پورگی کنه گیاه‌خوار *Cenopalpus irani* پرورش یافته روی چهار رقم سیب.

Table 3. Population growth parameters (mean \pm SE) of *Typhlodromus bagdasarjani* fed on *Cenopalpus irani* nymphal stages reared on four apple cultivars.

Parameters	Apple cultivars			
	Kohanz Golab	Imperial Gala	Lebanon Red	Granny Smith
GRR (eggs/ individual)	12.56 \pm 1.74 d	15.96 \pm 2.13 c	17.55 \pm 2.18 b	23.00 \pm 2.76 a
R_0 (eggs/ individual)	11.23 \pm 1.15 c	14.32 \pm 1.51 bc	15.748 \pm 1.66 ab	19.62 \pm 2.08 a
r (day ⁻¹)	0.113 \pm 0.005 d	0.157 \pm 0.007 c	0.187 \pm 0.008 b	0.251 \pm 0.104 a
λ (day ⁻¹)	1.120 \pm 0.006 d	1.173 \pm 0.008 c	1.206 \pm 0.010 b	1.287 \pm 0.134 a
T (day)	21.27 \pm 0.26 a	16.85 \pm 0.18 b	14.66 \pm 0.23 c	11.85 \pm 0.16 d

The means followed by different letters in the same row are significantly different ($P < 0.05$, paired-bootstrap test).

مصرف طعمه. میانگین طعمه مصرفی روزانه و کل طعمه مصرف شده در مراحل مختلف رشد *T. bagdasarjani* در بین ارقام مورد آزمایش تفاوت معنی داری داشت (جدول ۴ و ۵). میانگین مصرف روزانه طعمه توسط پوره سن اول شکارگر در گلاب کههنز (۳/۳۳ طعمه/روز) به طور معنی داری بیشتر از کالا امپریال (۷/۰۷ طعمه/روز)، قرمز لبنان (۶/۵۳ طعمه/روز) و گرانی اسمیت (۵/۲۶ طعمه/روز) بود. همچنین، میانگین تعداد مصرف طعمه روزانه توسط حشرات بالغ ماده در دوره تخم‌گذاری در گلاب کههنز، کالا امپریال، قرمز لبنان و گرانی اسمیت به ترتیب ۲۵/۱۷، ۲۱/۳۵، ۲۰/۲۶ و ۱۸/۳۱ طعمه/روز بود (جدول ۴ و ۵). مقدار کل طعمه مصرفی در مراحل مختلف سنی شکارگر نیز تحت تأثیر ارقام مختلف قرار گرفت. مجموع طعمه مصرفی تمامی مراحل رشد نابالغ در گلاب کههنز، کالا امپریال،

قرمز لینان و گرانی اسمیت به ترتیب ۴۲/۹۰، ۳۴/۷۱، ۳۱/۸۳ و ۲۴/۵۳ طعمه بود. بیشترین و کمترین مصرف کل طعمه توسط حشرات بالغ با ۵۴۳/۷۶ و ۲۷۶/۷۶ طعمه به ترتیب در گلاب کهنز و گرانی اسمیت به دست آمد (جدول ۴ و ۵).

جدول ۴- میانگین (\pm خطای معیار) میزان شکار روزانه مراحل مختلف سنی کنه شکارگر *Typhlodromus bagdasarjani* از مرحله پوره سن اول کنه گیاهخوار *Cenopalpus irani* پرورش یافته روی چهار رقم سیب.

Table 4. Duration (mean \pm SE) daily prey consumption by different stages of *Typhlodromus bagdasarjani* on protonymphal stage of *Cenopalpus irani* reared on four apple cultivars.

Life stages	Apple cultivars			
	Kohanz Golab	Imperial Gala	Lebanon Red	Granny smith
Protonymph	8.33 \pm 0.14 a	7.07 \pm 0.11 b	6.53 \pm 0.13 c	5.26 \pm 0.13 d
Deutonymph	9.96 \pm 0.20 a	8.83 \pm 0.18 b	8.43 \pm 0.16 b	7.27 \pm 0.16 c
Immature stages	18.30 \pm 0.33 a	15.90 \pm 0.28 b	14.97 \pm 0.28 b	12.51 \pm 0.28 c
Pre-oviposition	14.80 \pm 0.14 a	12.93 \pm 0.14 b	12.20 \pm 0.19 c	11.06 \pm 0.20 d
Oviposition	25.17 \pm 0.14 a	21.35 \pm 0.16 b	20.26 \pm 0.15 c	18.31 \pm 0.17 d
Post-oviposition	12.10 \pm 0.15 a	10.73 \pm 0.15 b	10.35 \pm 0.16 b	9.30 \pm 0.16 c
Adult	52.07 \pm 0.41 a	45.03 \pm 0.44 b	42.76 \pm 0.48 c	38.66 \pm 0.51 d

Means followed by the different letters in the same row are significantly different ($P < 0.05$, Tukey's test).

جدول ۵. میانگین (\pm خطای معیار) میزان کل شکار مراحل مختلف سنی کنه شکارگر *Typhlodromus bagdasarjani* از مرحله پوره سن اول کنه گیاهخوار *Cenopalpus irani* پرورش یافته روی چهار رقم سیب.

Table 5. Duration (mean \pm SE) total prey consumption by different stages of *Typhlodromus bagdasarjani* on protonymphal stage of *Cenopalpus irani* reared on four apple cultivars.

Life stages	Apple cultivars			
	Kohanz Golab	Imperial Gala	Lebanon Red	Granny smith
Protonymph	18.37 \pm 0.55 a	14.73 \pm 0.50 b	13.45 \pm 0.26 b	10.76 \pm 0.26 c
Deutonymph	24.53 \pm 0.38 a	19.96 \pm 0.33 b	18.40 \pm 0.29 c	13.77 \pm 0.28 d
Immature stages	42.90 \pm 0.90 a	34.71 \pm 0.81 b	31.83 \pm 0.53 c	24.53 \pm 0.55 d
Pre-oviposition	33.63 \pm 0.56 a	23.80 \pm 0.59 b	20.03 \pm 0.40 c	13.47 \pm 0.38 d
Oviposition	412.17 \pm 6.94 a	315.61 \pm 6.67 b	285.35 \pm 6.59 c	215.03 \pm 6.52 d
Post-oviposition	97.97 \pm 1.34 a	79.96 \pm 0.133 b	71.50 \pm 1.211 c	48.27 \pm 1.17 d
Adult	543.76 \pm 8.75 a	419.40 \pm 8.44 b	376.87 \pm 8.12 c	276.76 \pm 8.00 d

Means followed by the different letters in the same row are significantly different ($P < 0.05$, Tukey's test).

بحث و نتیجه گیری

این مطالعه اطلاعات جدیدی در مورد تأثیر معنی دار چهار رقم سیب بر پارامترهای جدول زندگی و همچنین میزان شکار *T. bagdasarjani* ارائه می دهد. کل طول دوره رشدی مراحل نابالغ شکارگر در گلاب کهنز با ۹/۹۰ و ۱۰/۵۳ روز و گرانی اسمیت با ۵/۶۱ و ۵/۷۳ روز برای ماده و نر به ترتیب طولانی ترین و کوتاه ترین روز را به خود اختصاص دادند. مشابه نتایج ما (Jafarian et al., 2023) دریافتند که طول دوره رشدی مراحل نابالغ *T. bagdasarjani* با تغذیه از *E. frosti* در چهار رقم سیب تفاوت معنی داری دارد و از ۹/۲۶ روز در رقم گلاب کهنز (مقاوم) تا ۵/۲۶ روز در رقم گرانی اسمیت (حساس) متغیر بود. طول دوره رشدی مراحل نابالغ *T. bagdasarjani* با تغذیه از مراحل نابالغ *T. urticae* پرورش یافته روی لوبیا در دمای ۲۵ درجه سلسیوس ۸/۹ روز توسط Ganjissaffar et al. (2011b) و با تغذیه از مرحله تخم *T. urticae* ۷/۹۸ روز توسط Moghadasi et al. (2014) گزارش شد که یافته های این دو محقق کمتر از مقدار به دست آمده در رقم گلاب کهنز و بیشتر از مقدار به دست آمده در رقم گرانی اسمیت در پژوهش ما بود. زمان رشد طولانی مدت می تواند به دلیل شرایط نامناسب پرورش یا کیفیت میزبان باشد (Van Lenteren & Noldus, 1990).

خواص گیاه میزبان ممکن است با تأثیرات منفی بر رشد جمعیت، بقاء و باروری بر صفات تاریخیچه زندگی شکارگران تأثیر بگذارد (Schadler et al., 2010; Bergman & Tingey, 1979). یافته های ما نشان داد که بیشترین باروری شکارگر در گرانی اسمیت (۳۲/۷۸ تخم/ماده) و کمترین آن روی گلاب کهنز (۱۹/۱۷ تخم/ماده) مشاهده شد. به طور مشابه، مطالعه قبلی ما نشان داد که *E. frosti* پرورش یافته در رقم گلاب کهنز کمترین باروری و میزان بقا را در بین هفت رقم سیب مورد آزمایش داشت (Jafarian et al., 2020). (Jafarian et al., 2023) گزارش دادند که عملکرد تولیدمثلی و بقای *T. bagdasarjani* در رقم گلاب کهنز (۲۷/۲۸ تخم/ماده) کمتر از رقم گرانی اسمیت (۴۱/۹۸ تخم/ماده) بود. (Khanamani et al., 2014) گزارش دادند که عملکرد تولیدمثلی و بقای *T. bagdasarjani* در رقم نیشابور بادمجان (۱۵/۶۶ تخم/ماده) کمتر از رقم اصفهان بادمجان (۲۱/۷۶ تخم/ماده) بادمجان بود. آنها نقش تجمع بیشتر متابولیت های ثانویه در ارقام مقاوم و تفاوت محتوای عناصر غذایی در ارقام حساس و مقاوم را برای توجیه این تفاوت ها ذکر کردند. همچنین باروری *T. bagdasarjani* با تغذیه از *C. irani* پرورش یافته روی برگ سیب در شرایط آزمایشگاهی ۳۰/۷۴ تخم/ماده گزارش شد که کمتر از یافته ما روی رقم گرانی اسمیت و بیشتر از یافته ما روی رقم گلاب کهنز بود (Bazgir et al., 2019). از آنجایی که میزان باروری برای کنه های فیتوزئیده روی طعمه مناسب بین ۳۰ تا ۵۴ تخم به ازای هر ماده است (Canlas et al., 2006; Zhang et al., 2000). می توان نتیجه گرفت که طعمه *C. irani* پرورش یافته روی رقم گرانی اسمیت در آزمایش ما نسبت به رقم گلاب کهنز برای شکارگر *T. bagdasarjani* یک منبع غذایی مناسب تر است. این تفاوت را می توان به ارزش غذایی هر یک از دو رقم مذکور نسبت داد.

از آنجایی که نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) به عنوان بازتابی از باروری، زمان نمو و بقای جمعیت است، کیفیت فیزیولوژیکی یک حشره را در رابطه با ظرفیت افزایش آن به اندازه کافی خلاصه می کند (Krips et al., 1998; Janssen & Sabelis, 1992). بنابراین، مهم ترین پارامتر برای ارزیابی عملکرد یک حشره بر روی

گیاهان میزبان مختلف و همچنین ارزیابی مقاومت گیاه میزبان است (Bazgir et al., 2019). به گفته (Razmjou et al., 2006; Darvishzadeh & Jafari, 2016). نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) برای *T. bagdasarjani* با تغذیه از *C. irani* پرورش یافته روی رقم گلاب کهزن 0.137 روز⁻¹ بود. در مطالعه ما بیشترین و کمترین مقدار r مربوط به شکارگرهایی بود که از *C. irani* پرورش یافته روی رقم گرانی اسمیت (0.251 روز⁻¹) و گلاب کهزن (0.113 روز⁻¹) تغذیه کردند. مشابه نتایج ما (2014) Khanamani et al. نیز گزارش کردند مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) این کنه شکارگر روی رقم حساس بادمجان (0.188 روز⁻¹) بیش تر از رقم مقاوم بادمجان (0.119 روز⁻¹) بود. در آزمایش ما، مقدار بالای r روی رقم گرانی اسمیت نشان می‌دهد که کنه شکارگر پتانسیل رشد جمعیت بالایی روی این رقم داشته و این بیانگر مناسب بودن این رقم نسبت به رقم گلاب کهزن می‌باشد. رقم گلاب کهزن به واسطه دوره طولانی نمو، بقاء پایین مراحل نابالغ و نرخ تولید مثلی نسبتاً پایین کنه شکارگر و در نتیجه مقدار پایین r روی آن، در مقایسه با رقم گرانی اسمیت مطلوبیت کمتری را برای کنه شکارگر داشت. دو عامل مهم خصوصیات فیزیکی برگ‌ها و متابولیت‌های ثانویه گیاه هستند که بیشترین تأثیر را در سطوح تغذیه‌ای بعدی دارند. در مطالعات قبلی ما گلاب کهزن دارای کمترین میزان و کوتاهترین تریکوم بود (Jafarian et al., 2020)، اما هم طعمه و هم شکارگرها کمترین نرخ رشد را روی آن نشان دادند، بنابراین می‌توان ادعا کرد که نقش متابولیت‌های ثانویه در بروز این نتایج مهم‌تر است. مقدار پارامتر r کنه شکارگر *T. bagdasarjani* در محدوده‌ی دمایی ۱۵-۳۵ درجه سلسیوس دامنه‌ای از 0.2 روز⁻¹ تا 0.19 روز⁻¹ داشت (Ganjisaffar et al., 2011b). (Bruce-Oliver & Hoy, 1990) مقدار پارامتر r را برای کنه شکارگر *T. occidentalis* برابر 0.207 روز⁻¹، Saito (1990) برای *T. bambusa* Ehara برابر 0.164 روز⁻¹، Castagnoli et al. (1989) برای *T. exhilarates* Ragusa برابر 0.178 روز⁻¹، Ferragut et al. (1987) برای *T. phialatus* Athias-Henriot برابر 0.441 روز⁻¹ و Kropczynska et al. (1988) برای *T. pyri* برابر 0.089 روز⁻¹ برآورد نمودند. تفاوت مشاهده شده در مقادیر r به دست آمده در این پژوهش‌ها اساساً به خاطر تفاوت در گونه‌ی شکارگر، میزبان‌های گیاهی، شرایط انجام آزمایش، رژیم غذایی مورد استفاده در آزمایش و اختلافات ژنتیکی بین جمعیت‌های کنه شکارگر می‌باشد.

برخلاف پارامترهای جدول زندگی، میزان شکار کنه شکارگر *T. bagdasarjani* از پوره‌ی سن اول *C. irani* پرورش یافته روی رقم گلاب کهزن بیش تر از سایر ارقام بود. در مطالعات قبلی ما کوتاهترین تریکوم‌ها در گلاب کهزن و بلندترین تریکوم‌ها در گرانی اسمیت مشاهده شد (Jafarian et al., 2022)، بنابراین احتمالاً میزان بالای تغذیه کنه شکارگر از پوره‌ی سن اول *C. irani* پرورش یافته در گلاب کهزن می‌تواند مربوط به تراکم کم تر و طول کوتاه تر تریکوم باشد که حرکت شکارگر را تسهیل می‌کند و به راحتی می‌تواند به طعمه دسترسی داشته باشد (Kaplán & Thaler, 2010; Kaitaniemi, 2004; Skirvin & De Courcy Williams, 1999) و یا می‌تواند مربوط به اندازه کوچک تر کنه‌های شکار پرورش یافته در این رقم (به دلیل پایین بودن کیفیت غذایی رقم مقاوم) باشد و لذا شکارگر برای سیر شدن نیازمند مصرف تعداد بیشتری از شکار می‌باشد (Cogni et al., 2002). همچنین، تریکوم‌های سطح برگ احتمالاً از تغذیه طعمه جلوگیری می‌کنند، بنابراین حرکت آن‌ها را در گیاه میزبان افزایش می‌دهند و در نتیجه آسیب پذیری آن‌ها را در برابر شکارگران افزایش می‌دهند (Kaitaniemi, 2004; Bergelson & Lawton, 1988). (Ganjisaffar et al., 2011b) گزارش دادند که کل طعمه مصرف شده در پوره سن اول و پوره سن دوم این شکارگر روی رقم لوبیا به ترتیب $8/99$ و $9/06$ پوره بود که کمتر از مقادیر به دست آمده در مطالعه ما بود. (Khanamani et al., 2014) گزارش دادند که کل طعمه مصرفی *T. bagdasarjani* در مرحله تخم‌گذاری روی رقم نیشابور (مقاوم) به میزان $291/83$ بود که کمتر از مقدار به دست آمده از رقم گلاب کهزن (مقاوم) در آزمایش ما بود. آنها همچنین کل طعمه مصرف شده در مرحله تخم‌گذاری در رقم اصفهان (حساس) را $175/14$ پوره گزارش کردند که بیشتر از مقدار به دست آمده از رقم گرانی اسمیت (حساس) در آزمایش ما بود. از آنجایی که در این تحقیق اثر رقم مقاوم (گلاب کهزن) به کنه آفت بر روی شکارگر دوگانه بود، یعنی علیرغم تأثیر منفی بر پارامترهای رشدی آنها منجر به افزایش توانایی شکار آنها شد، به نظر می‌رسد مطالعات تکمیلی برای بررسی استفاده تلفیقی از رقم گلاب کهزن و کنه شکارگر و تعیین کارایی آنها در شرایط مزرعه ضروری است.

سپاسگزاری

بدینوسیله از همکاری‌های ارزشمند گروه گیاهپزشکی دانشگاه لرستان در پیش برد اهداف این تحقیق صمیمانه قدردانی می‌شود.

REFERENCES

- Bazgir, F., Jafari, S. & Shakarami, J. (2015a) Influence of temperature on life table parameters of Iranian false spider mite, *Cenopalpus irani* Dosse (Tenuipalpidae) on apple leaves. International Journal of Acarology 41, 1-9. doi:10.1080/01647954.2014.983164.
- Bazgir, F., Jafari, S., Shakarami, J. & Bahirae, F. (2015b) Effect of temperature on the reproductive parameters and survival of *Cenopalpus irani* Dosse (Tenuipalpidae). Acarina 23, 181-187. doi:10.11158/saa.22.3.7.
- Bazgir, F., Shakarami, J. & Jafari, S. (2019) Life table and predation rate of *Typhlodromus bagdasarjani* (Acari: Phytoseiidae) fed on *Eotetranychus frosti* (Tetranychidae) on apple leaves. International Journal of Acarology 45, 202-208. doi:10.1080/01647954.2019.1584241.
- Bergelson, J. M. & Lawton J. H. (1988) Does foliage damage influence predation on the insect herbivores of birch? Ecology 69, 434-445. doi:10.2307/1940442.
- Bergman, J. M. & Tingey, W. M. (1979) Aspects of interaction between plant genotypes and biological control. Bulletin of the Entomological Society of America 25, 275-279. doi:10.1093/besa/25.4.275.
- Boethel, D. J. & Eikenbary, R. D. (1986) Interactions of plant resistance and parasitoids and predators of insects. Ellis Horwood, Chichester 224 p. doi:10.1080/02757548708070836.

- Bottrell, D. G., Barbosa, P. & Gould, F. (1998)** Manipulating natural enemies by plant variety selection and modification: a realistic strategy. *Annual Review of Entomology* 43:347–367. doi:10.11158/saa.23.8.11.
- Bruce-Oliver S, J. & Hoy, M. A. (1990)** Effect of prey stage on life-table attributes of a genetically manipulated strain of *Metaseiulus occidentalis* (Acari: Phytoseiidae). *Experimental and Applied Acarology* 9, 201-207.
- Canlas, L. J., Amano, H., Ochiai, N. & Takeda, M. (2006)** Biology and predation of the Japanese strain of *Neoseiulus californicus* (McGregor) (Acari: Phytoseiidae). *Systematic and Applied Acarology* 11, 141-157.
- Carbonaro, M. A., Moreland, D. E., Edg, V. E., Matoyama, N., Rock, G. C. & Dauterman, W. C. (1986)** Studies of the mechanisms of cyhexatin resistance in the twospotted mite *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae). *Journal of Economic Entomology* 79, 579-580. doi:10.1093/jee/79.3.576.
- Castagnoli, M., Amato, F. & Monagheddu, M. (1989)** Osservazioni parametriche demografiche di *Eotetranychus carpini* (Oudemans) (Acarina: Tetranychidae) e del suo predatore *Typhlodromus exbilaratus* Ragusa (Acarina: Phytoseiidae) in condizioni di laboratorio. *Redia* 72, 545-557.
- Chi, H. & Liu, H. (1985)** Two new methods for the study of insect population ecology. *Bulletin de l'Institut de Zoology, Academia Sinica* 24, 225–240.
- Chi, H. (2018)** TWSEX-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex life table analysis. <https://140.120.197.173/Ecology/Download/TWSEX-MSChart.rar>.
- Cogni, R., Freitas, A. V. L. & Amaral Filho, B. F. (2002)** Influence of prey size on predation success by *Zelus longipes* L. (Het., Reduviidae). *Journal of Applied Entomology* 126, 74-78. doi:10.1046/j.1439-0418.2002.00593.x.
- Daneshvar, H. (1993)** Year of Conferenc. Distribution of two predatory mite *Amblydromella kettanehi* and *Euseius libanesei* (Acari: Phytoseiidae) in Iran. In. Abstract book of the 11 th Iranian Plant Protection Congress, University of Guilan, Rasht, Iran, 260 p.
- Darbemamieh, M. (2009)** Tetranychoid mites and their acarina predators in Kermanshah orchards; Spatial distribute on population dynamics of some species on apples. MSC. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 116 pp.
- Darbemamieh, M., Kamali K. & Fathipour, Y. (2009)** Bionomics of *Cenopalpus irani*, *Bryobia rubrioculus* and their egg predator *Zetzellia mali* (Acari: Tenuipalpidae, Tetranychidae, Stigmaeidae) in natural conditions. *Munis Entomology and Zoology* 4, 341-354. doi:10.1080/09670874.2016.1175684.
- Darvishzadeh, S. & Jafari, Sh. (2016)** Life history performance of *Aphis gossypii* Glover (Aphididae) on seven cucumber cultivars. *International Journal of Pest Management*, 62(3), 245–250. doi: 10.1080/09670874/.2016.1175684.
- Demite, P. R., McMurtry, J. A. & Moraes, G. (2014)** Phytoseiidae database: a website for taxonomic and distributional information on phytoseiid mites (Acari). *Zootaxa* 3795, 571–577. doi:10.11646/zoo.taxa.3795.5.6.
- Desneux, N., Decourtye, A. & Delpuech, J. M. (2007)** The sublethal effects of pesticides on beneficial arthropods. *Annual Review of Entomology* 52, 81–106. doi: 10.1146/annurev.ento.52.110405.091440.
- Dosse, G. (1971)** Die Familie Tenuipalpidae in Iran (Acari). *Pflanzkrankheiten und Pflanzenschutz* 78, 577–585. doi:10.5281/zenodo.6169186.
- Farazmand, A., Fathipour, Y. & Kamali, K. (2012)** Functional response and mutual interference of *Neoseiulus californicus* and *Typhlodromus bagdasarjani* (Acari: Phytoseiidae) on *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae). *International Journal of Acarology* 38, 369-376.
- Ferragut, F., Garcia-Mari, F., Costa-Comelles, J. & Laborda, R. (1987)** Influence of food and temperature on development and oviposition of *Euseius stipulatus* and *Typhlodromus phialatus* (Acari: Phytoseiidae). *Experimental and Applied Acarology* 3, 317-330. doi:10.1007/BF01193168.6169186.
- Ganjisaffar, F., Fathipour, Y. & Kamali, K. (2011a)** Effect of temperature on prey consumption of *Typhlodromus bagdasarjani* (Acari: Phytoseiidae) on *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae). *International Journal of Acarology* 37, 556–560. doi:10.1080/01647954.2010.528800.
- Ganjisaffar, F., Fathipour, Y. & Kamali, K. (2011b)** Temperature-dependent development and life table parameters of *Typhlodromus bagdasarjani* (Phytoseiidae) fed on twospotted spider mite. *Experimental and Applied Acarology* 55, 259–272. doi:10.1007/s10493-011-9467-z.
- Gingras, D. & Boivin, G. (2002)** Effect of plant structure, host density and foraging duration on host finding by *Trichogramma evanescens* (Hymenoptera: Trichogrammatidae). *Environmental Entomology* 31, 1153–1157. doi:10.1603/0046-225x-31.6.1153.
- Gould, F., Kennedy, G. G. & Johnson, M. T. (1991)** Effects of natural enemies on the rate of herbivore adaption to resistant host plants. *Entomological Experimentalis et Applicata* 58, 1–14.
- Guedes, R. N. C., Smagghe, G., Stark, J. D. & Desneux, N. (2016)** Pesticide-induced stress in arthropod pests for optimized integrated pest management programs. *Annual Review of Entomology* 61, 43–62. doi:10.1146/annurev-ento-010715-023646.
- Hajizadeh, J., Hosseini, R. & McMurtry, J. A. (2002)** Phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) associated with eriophyid mites (Acari: Eriophyidae) in Guilan province of Iran. *International Journal of Acarology* 28, 373–378. doi:10.1080/01647950208684313.
- Hare, J. D. (1992)** Effects of plant variation on herbivore–natural enemy interactions. In “Plant Resistance to Herbivores and Pathogens” (R. S. Fritz and E. L. Simms, Eds.), pp. 278-298. Univ. of Chicago Press, Chicago.
- Havill, N. P. & Raffa, K. F. (2000)** Compound effects of induced plant responses on insect herbivores and parasitoids: implication for tritrophic interactions. *Ecological Entomology* 25,171–179. doi:10.1046/j.1365-2311-2000-00247.x.
- Huang, Y. B. & Chi, H. (2013)** Life tables of *Bactrocera cucurbitae* (Diptera: Tephritidae): with an invalidation of the jackknife technique. *Journal of Applied Entomology* 137, 327–339. doi:10.1111/jen.12002.

- Hunter, M. D. (2003) Effects of plant quality on the population ecology of parasitoids. *Agricultural and Forest Entomology* 5, 1-8. doi: 10.1046/j.1461-9563.2003.00168.x.
- Jafari, S. & Bazgir, F. (2015) Life history traits of predatory mite *Typhlodromus* (Anthoseius) *bagdasarjani* (Phytoseiidae) fed on *Cenopalpus irani* (Tenuipalpidae) under laboratory conditions. *Systematic and Applied Acarology* 20, 366-375. doi:10.11158/saa.20.4.2.
- Jafari, S. (2010) Phytoseiid mites of the Lorestan province and determining the predation efficiency of *Neoseiulus barkeri* (Phytoseiidae). Ph.D. thesis, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, 192 pp.
- Jafari, S., Rahmati, M. & Bahirae, F. (2014) Spatial and temporal distribution of *Eotetranychus frosti* and *Cenopalpus irani* and their predator *Typhlodromus bagdasarjani* in an unsprayed apple orchard at Khorramabad, Western Iran. *Persian Journal of Acarology* 3, 51-61. doi:10.22073/pja.v3i.10130.
- Jafarian, F., Jafari, S. & Fathipour, Y. (2020) Evaluation of antibiosis resistance in seven apple cultivars to *Eotetranychus frosti* (Tetranychidae). *Systematic and Applied Acarology* 25(3), 525-537. doi:10.11158/saa.25.3.12.
- Jafarian, F., Jafari, S. & Fathipour, Y. (2022) Functional response of the predatory mite, *Typhlodromus bagdasarjani* (Acari: Phytoseiidae) to protonymphs of *Eotetranychus frosti* (Acari: Tetranychidae) on four apple cultivars. *Acarologia* 62(2), 454-464. doi:10.24349/7ejy-uk7s.
- Jafarian, F., Jafari, S. & Fathipour, Y. (2023) Study of life table and predation efficiency of *Typhlodromus bagdasarjani* (Mesostigmata: Phytoseiidae) fed *Eotetranychus frosti* (Trombidiformes: Tetranychidae) reared on different apple cultivars. *International Journal of Acarology* 49(2), 112-119. doi:10.1080/01647954.2023.2215784.
- Janssen, A. & Sabelis, M. (1992) Phytoseiid life-histories, local predator-prey dynamics, and strategies for control of tetranychid mites. *Experimental and Applied Acarology* 14, 233-250. doi:10.1007/BF01200566.
- Kagata, H., Nakamura, M. & Ohgushi, T. (2005) Bottom-up cascade in a tri-trophic system: different impacts of host-plant regeneration on performance of a willow leaf beetle and its natural enemy. *Ecological Entomology* 30, 58-62. doi:10.1111/j.0307-6946.2005.00667.x.
- Kaitaniemi, P. (2004) Movement and disappearance of mountain birch defoliators are influenced by the interactive effects of plant architecture and induced resistance. *Ecological Entomology* 29, 437-446. doi:10.1111/j.0307-6946.2004.00617.x.
- Kamali, K. (1989) A part of plant mite fauna of Khouzestan. *Scientific Journal of Agriculture* 13, 73-83.
- Kamali, K., Ostovan H. & Atamehr, A. (2001) A catalog of mites and ticks (Acari) of Iran. Islamic Azad University Scientific Publication Center, 192 p. doi:10.13140/2.1.4825.8244.
- Kaplan, I. & Thaler, J. S. (2010) Plant resistance attenuates the consumptive and non-consumptive impacts of predators on prey. *Oikos* 119, 1105-1113. doi:10.1111/j.1600-0706.2009.18311.x.
- Khanamani, M., Fathipour, Y. & Hajiqanbar, H. (2015) Assessing compatibility of the predatory mite *Typhlodromus bagdasarjani* (Acari: Phytoseiidae) and resistant eggplant cultivar in a tritrophic system. *Annals of the Entomological Society of America* 108, 501-512. doi:10.1093/aesa/sav032.
- Khanamani, M., Fathipour, Y., Hajiqanbar, H. & Sedaratian, A. (2014) Two-spotted spider mite reared on resistant eggplant affects consumption rate and life table parameters of its predator, *Typhlodromus bagdasarjani* (Acari: Phytoseiidae). *Experimental and Applied Acarology* 63, 241-252. doi:10.1007/s10493-014-9785-z.
- Khanjani, M. (1996) Mites (Acari) associated with Fabaceae plants in Hamedan and functional response of *Anystis bacarum* (L.) and *Erythraeus* sp. To developmental stages of *Tetranychus urticae*. Ph.D. dissertation, Tarbiat Modares University, 430 pp.
- Khanjani, M. & Hadad Irani-nejad, K. (2006) Injurious mites of agricultural crops in Iran. Bu-Ali university press, 530 pp.
- Krips, O. E., Witul, A., Willems, P. E. L. & Dicke M. (1998) Intrinsic rate of population increase of the spider mite *Tetranychus urticae* on ornamental crop gerbera: intraspecific variation in host plant and herbivore. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 89, 159-168. doi:10.1046/j.1570-7458.1998.00395.x.
- Kropczynska, D., van de Vrie, M. & Tomczyk, A. (1988) Bionomics of *Eotetranychus tilarium* and its phytoseiid predators. *Experimental and Applied Acarology* 5, 65-82.
- Lorenzen, G. H., Balbyshev, N. F., Lafta, A. M., Casper, H., Tlan, X. & Sagredo, H. (2001) Resistant potato selections contain leptine and inhibit development of the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae). *Journal of Economic Entomology* 94, 1260-1267. doi:10.1603/0022-0493-94.5.1260.
- Maxwell, F. G. & Jennings, P. R. (1931) Breeding plants resistant to insects. John Wiley and Sons, 683 pp.
- McMurtry, J. & Croft, B. (1997) Life-styles of phytoseiid mites and their roles in biological control. *Annual Review of Entomology* 42, 291-321. doi:10.1146/annurev.ento.42.1.291.
- McMurtry, J. A., De Moraes, G. J. & Sourassou, N. F. (2013) Revision of the lifestyles of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) and implications for biological control strategies. *Systematic and Applied Acarology* 18, 297-321. doi:10.11158/saa.18.4.1.
- Mehrnejad, M. R. & Ueckermann, E. A. (2001) Mites (Arthropoda: Acari) associated with pistachio tree (Anacardiaceae) in Iran (I). *Systematic and Applied Acarology special publications* 6, 1-12. doi:10.11158/saasp.6.1.1.
- Mesa, N. C., Ochoa, R., Welbourn, W. C., Evans, G. A. & Moraes, G. J. (2009) A catalog of the Tenuipalpidae (Acari) of the World with a key to genera. *Zootaxa* 2098, 1-185.

- Moghadasi, M. & Allahyari, H. (2017) Effect of prey and pollen on interactions between *Typhlodromus bagdasarjani* and *Phytoseiulus persimilis* (Acari: Phytoseiidae) on cucumber (Cucurbitaceae). *The Canadian Entomologist* 149, 581-591. doi:10.4039/tce.2017.28.
- Moghadasi, M., Saboori, A., Allahyari, H. & Golpayegani, A. Z. (2013) Prey stages preference of different stages of *Typhlodromus bagdasarjani* (Acari: Phytoseiidae) to *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae) on rose. *Persian Journal of Acarology* 2, 531-538.
- Moghadasi, M., Saboori, A., Allahyari, H. & Zahedi Golpayegani, A. (2014) Life table and predation capacity of *Typhlodromus bagdasarjani* (Acari: Phytoseiidae) feeding on *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae) on rose. *International Journal of Acarology* 40, 501-508. doi:10.1080/01647954.2014.962084.
- Ode, P. J. (2006) Plant chemistry and natural enemy fitness: effects on herbivore and natural enemy interactions. *Annual Review of Entomology* 51, 163-185. doi: 10.1146/annurev.ento.51.110104.151110.
- Prager, S. M., Wallis, C. M., Jones, M., Novy, R. & Trumble, J. T. (2018) Examining the potential role of foliar chemistry in imparting potato germplasm tolerance to potato psyllid, green peach aphid, and zebra chip disease. *Journal of Economic Entomology* 111, 327-336. doi:10.1093/jee/tox255.
- Rahmani, H., Fathipour, Y. & Kamali, K. (2010) Spatial Distribution and seasonal activity of *Panonychus ulmi* (Acari: Tetranychidae) and its predator *Zetzellia mali* (Acari: Stigmaeidae) in an apple orchard of Zanjan, Iran. *Journal of Agricultural Science Tehnology* 12, 1-11. doi:10.3906/zoo-0902-23.
- Rashki, M., Saboori, A., Nowzari, J. & Bagheri Zenouz, E. (2004) Biology of *Cenopalpus irani* Dosse (Acari: Tenuipalpidae) in Mahdasht region of Karaj, Iran. *Systematic and Applied Acarology* 9, 23-25. doi:10.11158/saa.9.1.4.
- Razmjou, J., Moharramipour, S., Fathipour, Y. & Mirhoseini, S. Z. (2006) Effect of cotton cultivar on performance of *Aphis gossypii* (Homoptera: Aphididae) in Iran. *Journal of Economic Entomology* 99, 1820-1825.
- Riahi, E., Fathipour, Y., Talebi, A. A. & Mehrabadi, M. (2016) Pollen quality and predator viability: life table of *Typhlodromus bagdasarjani* on seven different plant pollens and two-spotted spider mite. *Systematic and Applied Acarology* 21, 1399-1413. doi:10.1051/acarologia/20112029.
- Rojas, M. G. & Morales-Ramos, J. A. (2010) Tri-Trophic level impact of host plant Linamarin and Lotaustralin on *Tetranychus urticae* and its predator *Phytoseiulus persimilis*. *Journal of Chemical Ecology* 36, 1354-1362. doi:10.1007/s10886-010-9872-5.
- Saito, Y. (1990) Life-history and feeding habit of *Typhlodromus bambusae*, a specific predator of *Schizotetranychus celarius* (Acari: Phytoseiidae, Tetranychidae). *Experimental and Applied Acarology* 10, 45-51. doi:10.1007/BF01193972.
- SAS Institute. (2003) *Qualification Tools User Guide*, Version 9.1. Cary, NC, USA.
- Schadler, M., Brandl, R. & Kempel, A. (2010) Host plant genotype determines bottom-up effects in an aphid parasitoid-predator system. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 135, 162-169. doi:10.1111/j.1570-7458.2010.00976.x.
- Shirdel, D., Kamali, K., Ostovan, H. & Arbabi, M. Year of Conferenc. (2004) Functional response of the predatory mite, *Typhlodromus kettanehi* Dosse (Acari: Phytoseiidae) on two-spotted spider mite. In: *Proceedings of the 16th Iranian Plant Protection Congress*.
- Skirvin, D. J. & De Courcy Williams, M. (1999) Differential effects of plant species on a mite pest (*Tetranychus urticae*) and its predator (*Phytoseiulus persimilis*): implications for biological control. *Experimental and Applied Acarology* 23, 497-512. doi:10.1022/A:1006150521031.
- Tian, D., Tooker, J., Peiffer, M., Ho Chung, S. & Felton, G. W. (2012) Role of trichomes in defense against herbivores: comparison of herbivore response to woolly and hairless trichome mutants in tomato (*Solanum lycopersicum*). *Planta* 236, 1053-1066. doi:10.1007/s00425-012-1651-9.
- Trumble, J. L., Diawara, M. M., Quiros, C. F., Fokkema, N. J., Beek, M. A., Steekelenburg, N. A. M., Samyn, G., Maas, J. L. & Verhoyn, M. N. J. (2000) Breeding for resistance in *Apium graveolens* to *Liriomyza trifolii*: Antibiosis and liner furanocoumarin content. *Acta Horticulturae* 513, 29-37.
- Van Lenteren, J. C. & Noldus, L. P. J. J. (1990) Whitefly plant relationship: behavioral and biological aspects. In: Gerling D, editor. *Whitefly: their bionomics, pest status and management*. Andover (MA): Intercept. 4789 p.
- Zaher, M. A. & Yousef, A. A. (1972) Biology of the false spider mite *Tenuipalpus punicae* P. & B. in U. A. R. (Acarina: Tenuipalpidae). *Zeitschrift Für Angewandte Entomologie* 70, 23-29. doi:10.1111/j.1439-0418.1972.tb02146.x.
- Zhang, Y., Zhang, Z.-Q., Lin, J. & Ji, J. (2000) Potential of *Amblyseius cucumeris* (Acari: Phytoseiidae) as biological agent against *Schizotetranychus nanjingensis* (Acari: Tetranychidae) in Fujian, China. *Systematic and Applied Acarology Special Publication* 4, 109-124. doi:10.11158/saasp.4.1.11.

Life table parameters and predation capacity of *Typhlodromus bagdasarjani* (Phytoseiidae) fed on *Cenopalpus irani* (Tenuipalpidae) reared on different apple cultivars

Fatemeh Jafarian¹, Yaghoob Fathipour² & Shariar Jafari¹

1- Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

✉ jafarianfatemeh93@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0003-0778-4637>

✉ Shahriar.s@lu.ac.ir

 <https://orcid.org/0000-0002-8814-1953>

2- Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tebran, Iran.

✉ fathi@modares.ac.ir

 <https://orcid.org/0000-0002-7963-5409>

Article History

Received: x December 202x | Accepted: x ... 202x | Subject Editor:

Abstract

The life table parameters and predation rate of *Typhlodromus bagdasarjani* Wainstein & Arutunjan (Phytoseiidae) fed on *Cenopalpus irani* Dosse (Tenuipalpidae) nymphs reared on four apple cultivars Kohanz Golab, Imperial Gala, Lebanon Red, and Granny Smith were determined under laboratory conditions. The longest developmental time of immature stages in females was observed on Kohanz Golab, and the shortest one was on Granny Smith. The fecundity ranged from 19.17 eggs/female on Golab Kohanz to 32.78 eggs/female on Granny Smith. The highest and lowest intrinsic rate of increase (r) were obtained on Granny Smith (0.251 day⁻¹), and Kohanz Golab (0.113 day⁻¹), respectively. The total prey consumption by all immature stages on Kohanz Golab, Imperial Gala, Lebanon Red, and Granny Smith was 42.90, 34.71, 31.83, and 24.53 prey, respectively. The total prey consumption by adult females was 543.76 prey on Kohanz Golab, 419.40 prey on Imperial Gala, 376.87 prey on Lebanon Red, and 276.76 prey on Granny Smith. Our results showed that predator performance was strongly affected by feeding on *C. irani* mites reared on different apple cultivars, and also a significant difference was seen in the hunting capacity of *T. bagdasarjani* on different apple cultivars.

Keywords: Iranian false spider mite, *Cenopalpus irani*, *Typhlodromus bagdasarjani*, life table, apple cultivars

Corresponding Author: Fatemeh Jafarian: (E-mail: jafarianfatemeh93@gmail.com)

Citation: Jafarian, F., Fathipour, Y. and Jafari, S. (202x) Life table parameters and predation capacity of *Typhlodromus bagdasarjani* (Phytoseiidae) fed on *Cenopalpus irani* (Tenuipalpidae) reared on different apple cultivars. *J. Entomol. Soc. Iran*, 44 (1), 87–99. <https://doi.org/10.61186/jesi.44.1.7>